SYMBOL	TITLE	EXPLANATORY TEXT	STANDARD	REFERENCE
CE 2797	European Mark of Conformity	Shows a product's compliance with European Union requirements.	2017/745	Annex V
Rx only	Rx only	Federal U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	21 CFR 801.109(b)(1)	
QTY	Keep away from sunlight	Indicates a medical device that must be protected from light sources	ISO 15223-1:2021	5.3.2
MD	Medical device	Indicates that the item is a medical device	ISO 15223-1:2021	5.7.7
UDI	Unique Device Identifier	Indicates a carrier which contains unique device identification information	ISO 15223-1:2021	5.7.10

Diamville Materials, LLC
2911 Lidarr Lee and Quail
Carlsbad, CA 92010 USA
www.zirdent.com
(1)760-743-7744

ZD ZEST DENTAL SOLUTIONS

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany

L9805 REV A 2022-01

SPANISH

Bulk EZ PLUS®
Composite de relleno a granel de doble curado con tecnología IntelliTek®

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bulk EZ PLUS® es un composite de relleno a granel, fácil de usar y de doble curado, que ofrece una profundidad de curado ilimitada en una sola aplicación sin necesidad de varias capas y disponibilidad para curado en polimerizadores de luz. Bulk EZ PLUS® utiliza un complejo único de 20 nm, de ancha distribución de carga y tecnología de resina para proporcionar una alta resistencia a la flexión, facilidad de pulimentación y un efecto camaleón superior, todo en un solo paso. La tecnología IntelliTek® patentada de autocurado está diseñada para completar la polimerización de cualquier área que no haya sido alcanzada por la microfiltración en restauraciones. Además, Bulk EZ PLUS ofrece un color muy homogéneo en el tiempo y es compatible con una amplia variedad de agentes adhesivos de recubrimiento de activadores de doble curado o primers.

CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad de curado ilimitada
- La tecnología IntelliTek® elimina prácticamente las microfiltraciones
- Los rellenos elimina de cristales ofrecen una mayor resistencia al desgaste, facilidad de pulimentado y un efecto camaleón
- La alta resistencia flexu y de tracción hacen que sea capaz de resistir bien las masticación
- Las tonalidades A1, A2, A3, A3.5, A3.5, C2, C3, Blanqueador y Color Wide (según la Guía de colores VITA) permiten una estética excelente en la mayoría de aplicaciones

INDICACIONES DE USO

Bulk EZ PLUS® es un restaurador dental de doble curado (autocuración con activación de fotopolimerización) basado en resina que, aplicado en superficies dentales previamente grabadas con primers o adhesivos adecuados, está indicado para su uso en:

- Restauraciones directas, clase I y II
- Restauraciones de clase III, IV y V
- Construcciones de núcleos
- Puntos adhesivos
- Coronas

Cualquier aplicación en la que la transmisión de luz sea inadecuada.

ACCESORIOS DE UN SOLO USO

Las puntas de mezcla no se han de usar ni y se suministran sin esterilizar. Las puntas de mezcla no deben modificarse. La ventilación de los accesorios de un solo uso puede hacer que estos no funcionen bien. Las puntas de mezcla no deben usarse en procedimientos inaceptados y provocan un funcionamiento inadecuado o el fallo del dispositivo. Deséchelos después de 12 h o de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación.

DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS

Las jeringas son dispositivos de varios usos que se suministran sin esterilizar. Utilice guantes en primeros en el momento de manipular la jeringa. Limpie y esterilice la jeringa, tapón o salva que podría transmitir una enfermedad infecciosa. Deséchelos de acuerdo con los siguientes instrucciones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Nunca mezcle Bulk EZ PLUS® con otros materiales. Volver a colocar tapón después de cada uso.
- Utilice una fuente de luz halógena para curado con una salida mínima de 600 mW/cm2. Otras fuentes de luz o intensidades requieren un ajuste del tiempo de curado. Consulte la guía de uso del fabricante de la fuente de luz curado.
- El material de la mina un cazar puede causar irritación, especialmente en personas que son sensibles a metacrilatos. Evite el contacto con la piel durante el manipular el material.
- El composite está diseñado para ser utilizado a temperatura ambiente. No vida del a temperatura ambiente durante el almacenamiento.
- No guardar el material composite cerca de productos que contengan eugenol. No dejar que el composite entre en contacto con productos que contengan eugenol. El eugenol puede afectar el endurecimiento del composite y causar decoloración.
- No exponer los dispensadores a la luz ambiental durante la mezcla.
- *Si debe prevenir la contaminación cruzada utilizando una punta de mezcla nueva para cada paciente y nunca dispensar.*

APLICACIÓN PARA RESTAURACIONES

PREPARACIÓN DE LA PIEZA DENTAL:

1. Aísle la pieza dental para evitar contaminación de sangre y/o saliva. Evite los usos recomendados se incluye el uso de una barrera de caucho, el sistema Isolite® o la barrera dental Retraction Gel Cure® de Zest.
2. Complete la preparación cavitaria convencional con los métodos convencionales o con un sistema de abrasión por aire como PrepStart® H2O de Zest.
3. Se recomienda el uso de Caries Finder™ de Zest para visualizar con precisión la remoción de la caries infectada reblandecida antes de la restauración.
4. Coloque una matriz seccional, como la fina contact matrix Mega-V® de Zest, a una hema de cuña para lograr un contorno y un contacto ideales.
5. Aplique un agente grabador, como Sure Etch® de Zest, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Aplique un agente adhesivo, como Prelude® o Prelude One® de Zest, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN:

1. Retire la barrera de caucho.
2. Aplique un agente adhesivo, como Prelude® o Prelude One® de Zest, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Coloque una matriz seccional, como la fina contact matrix Mega-V® de Zest, a una hema de cuña para lograr un contorno y un contacto ideales.
4. Aplique un agente grabador, como Sure Etch® de Zest, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Aplique un agente adhesivo, como Prelude® o Prelude One® de Zest, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Aplique bulk EZ PLUS® en cantidades profundas en áreas cercanas a la pulpa dentaria, utilice bloqueador de cúspides o otros procesos de colocación.
7. Aplique una luz de curado (auto-cure with light-cure acceleration) resin-based dental restorative that, when applied to dental surfaces pretreated with suitable primers or adhesives, is indicated for use as:
- Direct restoration, Class I through VI
- Cavity liner
- Core build-up
- Luting/Pin
- Crowns

Any application where light transmission may be inadequate.

SINGLE-USE ACCESSORIES

Mixing tips are single-use and are provided non-sterile. The mixing tips must not be modified. The design of accessories for single use may affect their performance and result in an improper procedure and lead to improper function or failure of the device. Dispose of after use in accordance with instructions below.

MULTI-USE DEVICES

Syringes are multi-use devices and are provided non-sterile. Always use a shield or other means to prevent exposure or transfer of blood, tissue, or saliva that may contain infectious disease. Use in accordance with instructions below.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Keep away from sunlight or ambient light. Replace cap after each use.
- Use a halogen curing light with a minimum output of 600 mW/cm2. Other light sources or intensities require an adjustment to the cure time. Use the curing light manufacturer's instructions.
- Uncured resin material can cause irritation, especially in people known to be allergic to methacrylates. Wash hands after handling material.
- The composite is formulated to be used at room temperature. Shelf life at room temperature is stated on the syringe.
- Do not store the composite in the proximity of eugenol-containing products. Do not let the composite come into contact with material containing eugenol.Eugenol can impair the hardening of the composite and cause discoloration.
- Do not expose materials to elevated temperatures or intense light.
- Avoid cross-contamination by using a new mixing tip for every patient and using a barrier sleeve.

APPLICATION FOR RESTORATIONS

TOOTH PREPARATION:

1. Isolate tooth to prevent contamination of blood and/or saliva. Suggested use includes a rubber dam, Isolite® System, or Zest's Dam Cure® light-cured dental dam.
2. Complete conventional cavity preparation with conventional means or with a hydro-abrasive system such as Zest's PrepStart® H2O.
3. Use of Zest's Caries Finder™ is recommended to accurately visualize carries removal without unnecessary tooth reduction.
4. Place sectional matrix such as Zest's Mega-V® Ring contact matrix system in a hema-ring for optimal interproximal shape and contact. Zest's contact matrix system or other tight matrix.
5. Apply etchant such as Zest's Sure Etch™ or similar per manufacturer's instructions.
6. Apply bonding agent such as Zest's Prelude® or Prelude One® per manufacturer's instructions.

RESTORATION PROCEDURE:

1. Remove the rubber dam.
2. Apply bonding agent such as Zest's Prelude® or Prelude One® per manufacturer's instructions.
3. Place sectional matrix such as Zest's Mega-V® Ring contact matrix system in a hema-ring for optimal interproximal shape and contact. Zest's contact matrix system or other tight matrix.
4. Apply etchant such as Zest's Sure Etch™ or similar per manufacturer's instructions.
5. Apply bonding agent such as Zest's Prelude® or Prelude One® per manufacturer's instructions.
6. Apply bulk EZ PLUS® in deep increments near pulp, utilize cusp blocker or other placement procedures.
7. Light cure each increment for 20 seconds. Overlap cusps for optimal cure.
8. Contour and polish restoration with Zest's Enhance® Finishing and Polishing System.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este producto contiene monómeros de metacrilato que pueden causar irritación cutánea, ocular o respiratoria y sensibilización en personas sensibles. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes. Lávese las manos después de manipular el producto.
- Polimerice con una lámpara de fotopolimerización de luz azul con una salida mínima de 1000 mW/cm2. Ajuste el tiempo de polimerización para otras lámparas o intensidades. Consulte las instrucciones del fabricante de la lámpara de polimerización.
- Evite la exposición prolongada a la luz ambiental.
- Cierre bien el tubo después de cada uso.
- Este producto no debe utilizarse en pacientes que sean alérgicos a los componentes de la fórmula.
- Si se produce una reacción alérgica, suspenda el uso del producto y busque atención médica.
- Para evitar la contaminación cruzada, use una matriz seccional nueva para cada paciente.

ALMACENAMIENTO

Almacene a una temperatura entre 2 °C y 25 °C (36 °F y 77 °F). Evite la exposición prolongada a la luz ambiental.

ELIMINACIÓN

Deseche los dispositivos usados que supongan un riesgo de infección de acuerdo con los procedimientos de desechos clínicos del centro, así como con las normativas locales y federales aplicables. Siempre que sea posible, recicle los envases (consulte con la autoridad competente a la normativa local y nacional (consulte la ficha de datos de seguridad según corresponda).

AVISO PARA LOS USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con los dispositivos a los que se aplican estas instrucciones de uso deberá notificarse al fabricante identificado en el título anteriormente y, si procede, al organismo competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

ITALIAN

Bulk EZ PLUS®
Composito di riempimento a dosaggio unico con tecnologia IntelliTek®

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Bulk EZ PLUS® è un composito di riempimento a dosaggio unico, facile da applicare, che offre una profondità di polimerizzazione illimitata in una singola applicazione senza strati multipli e disponibilità per la polimerizzazione con lampade a LED. Bulk EZ PLUS® utilizza un complesso chimico da 80 nm, che associa l'adattamento fluido alla carica ad alta densità, una tecnologia a resina che garantisce un'elevata resistenza superiore, tutto in un'unica, semplice fase. La tecnologia proprietaria autopolimerizzante IntelliTek® è stata poi combinata con la fotopolimerizzazione per garantire la continuazione della scopo di eliminare la microperdita dei restauri. Inoltre, Bulk EZ PLUS® presenta un colore estremamente stabile nel tempo ed è compatibile con una vasta gamma di agenti leganti senza la necessità di attivatore per doppia polimerizzazione o primer.

CARATTERISTICHE:

- Profondità di polimerizzazione illimitata
- La caratteristica diretta elimina praticamente tutte le microperdite
- Il riempimento chimico di chiusura da 80 nm offre una maggiore resistenza all'usura, lucidabilità ed effetto camaleonte
- L'elevata resistenza flessurale e l'elevata resilienza superficiale aggiungono una stasi di ripartenza a tutta la gamma di colori VITA Classical A1, A2, A3, A3.5, A3.5, C2, C3, Opaque Bleach e Wide Line (secondo la guida delle tonalità VITA) consentono di ottenere un'estetica eccellente e vanno ideali per la ricostruzione di monconi

INDICAZIONI D'USO

Bulk EZ PLUS® è un materiale restaurativo a base di resina a doppia polimerizzazione (autopolimerizzazione con accelerazione della fotopolimerizzazione) che, se applicato a superfici dentali pretrattate con primer o adesivi idonei, è indicato per l'uso come:

- Restauro diretto, Classe da I a VI
- Liner per cavità
- Ricostruzione di monconi
- Fissaggio/perni
- Corone

Qualsiasi applicazione in cui è possibile che la trasmissione della luce non sia adeguata.

ACCESSORI MONOUSO

I puntali di miscelazione non vengono e vengono forniti non sterili. I puntali di miscelazione non devono essere modificati. Se miniaturizzati, gli accessori monouso potrebbero non funzionare correttamente se utilizzati in modo improprio e nel manuale funzionamento del dispositivo. Smaltire dopo l'uso in conformità alle istruzioni riportate di seguito.

DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI

Le siringe sono dispositivi riutilizzabili che sono forniti non sterili. Utilizzare sempre una protezione o altro mezzi per prevenire l'esposizione o il trasferimento di sangue, tessuti o saliva che possono essere portatori di malattie infettive. Utilizzare in conformità alle istruzioni riportate di seguito.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Tenere al riparo dalla luce solare o dalla luce ambientale; ricoprire il tappo dopo ogni uso.
- Utilizzare una lampada fotopolimerizzatrice alogena con una potenza di emissione luminosa minima di 600 mW/cm2. Fonti o intensità di luce differenti da quelle descritte necessitano di un adattamento del tempo di polimerizzazione. Consultare le istruzioni del produttore della lampada fotopolimerizzatrice.
- Il materiale in resina non polimerizzato può causare irritazione, soprattutto in individui con allergia nota ai metacrilati. Lavare le mani dopo aver maneggiato il materiale.
- Il composito è formulato per essere utilizzato a temperatura ambiente. Non conservare a temperatura ambiente durante la conservazione.
- Non conservare il composito in prossimità di prodotti contenenti eugenolo. Evitare che il composito venga a contatto con materiale contenente eugenolo. L'eugenolo può compromettere l'indurimento del composito provocandone il colore.
- Non esporre i materiali a temperature elevate o luce intensa.
- Evitare la contaminazione crociata, usare un puntale di miscelazione nuovo per ogni paziente e utilizzare sempre una barriera.

APPLICAZIONE PER RESTAURI

PREPARAZIONE DELLA PIETRA DENTALE:

1. Isolare il dente per evitare la contaminazione da parte di sangue e/o saliva. Tra gli utilizzi consigliati si utilizzano quelli con la diga in caucciù, il sistema Isolite® o la diga dentale fotopolimerizzabile Dam Cure® di Zest.
2. Completare la preparazione cavitaria convenzionale con i metodi convenzionali o con un sistema di abrasione ad aria come PrepStart® H2O di Zest.
3. Si raccomanda di usare Caries Finder™ di Zest per una visualizzazione precisa della rimozione della carie infetta rammollita prima del restauro.
4. Collocare una matrice sezionale, come la fascia contact matrix Mega-V® di Zest, a una fascia di cuneo per ottenere un contorno e un contatto ideali.
5. Applicare un agente mordenzante, come Sure Etch™ di Zest o simile secondo le istruzioni del produttore.
6. Applicare un agente adesivo, come Prelude® o Prelude One® di Zest, secondo le istruzioni del produttore.

PROCEDURA DI RESTAURO:

1. Rimuovere la diga in caucciù.
2. Applicare un agente adesivo, come Prelude® o Prelude One® di Zest, secondo le istruzioni del produttore.
3. Collocare una matrice sezionale, come la fascia contact matrix Mega-V® di Zest, a una fascia di cuneo per ottenere un contorno e un contatto ideali.
4. Applicare un agente mordenzante, come Sure Etch™ di Zest o simile secondo le istruzioni del produttore.
5. Applicare un agente adesivo, come Prelude® o Prelude One® di Zest, secondo le istruzioni del produttore.
6. Applicare bulk EZ PLUS® in incrementi profondi vicino alla polpa dentale, utilizzare bloccatore di cuspidi o altre procedure di posizionamento.
7. Polimerizzare ogni incremento per 20 secondi. Sovrapporre le cuspidi per una polimerizzazione ottimale.
8. Modellare e lucidare il restauro con il sistema di finitura e lucidatura Enhance® di Zest.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Questo prodotto contiene monomeri a base di metacrilato che possono causare irritazione cutanea, oculare o respiratoria e sensibilizzazione in persone sensibili. Evitare il contatto con pelle e occhi. Indossare guanti. Lavare le mani dopo aver maneggiato il prodotto.
- Polimerizzare con una lampada fotopolimerizzatrice a luce blu con una potenza minima di 1000 mW/cm2. Regolare il tempo di polimerizzazione per altre lampade o intensità. Consultare le istruzioni del produttore della lampada fotopolimerizzatrice.
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce ambientale.
- Chiudere bene il tubo dopo ogni utilizzo.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato su pazienti che sono allergici a uno dei componenti della formulazione.
- In caso di reazione allergica, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi a un medico.
- Per evitare la contaminazione crociata, utilizzare una nuova matrice sezionale per ogni paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare a una temperatura tra 2 °C e 25 °C (36 °F e 77 °F). Evitare l'esposizione prolungata alla luce ambientale.

SMALTIMENTO

Smaltire i dispositivi usati che presentano un rischio di infezione in base alle procedure sui rifiuti clinici delle strutture e alle normative locali e statali applicabili. Per lo smaltimento riciclare gli imballaggi, se possibile (consultare l'autorità competente a livello locale o statale per le normative locali e statali (fare riferimento alla scheda dei dati di sicurezza ove opportuno).

AVVISO PER GLI UTENTI NELL'UNIONE EUROPEA

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione ai dispositivi ai quali si applicano le presenti istruzioni per l'uso devono essere segnalati al fabbricante identificato nel titolo precedente e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.

FRENCH

Bulk EZ PLUS®
Composite Bulk Fill à double polymérisation avec technologie IntelliTek®

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bulk EZ PLUS® est un composite Bulk Fill à polymérisation facile à mettre en place qui offre une profondeur de polymérisation illimitée en une seule application, ce qui élimine la nécessité de stratifier et permet la polymérisation par des photopolymérisateurs à base de can d'autopolymérisation. Bulk EZ PLUS® utilise des particules de remplissage sphériques de 20 nm à répartition étroite d'avancée, ce qui assure une résistance à la flexion supérieure à l'usure, une aptitude au polissage et un effet caméléon exceptionnel, le tout en une seule étape. La technologie brevetée d'autopolymérisation IntelliTek® est conçue pour combler et dérger quelquefoisement le retrait dus à l'infiltration de microfuites dans les restaurations. De plus, Bulk EZ PLUS® offre une couleur très homogène et est compatible avec un large éventail d'adhésifs, ce qui élimine la nécessité de recourir à des activateurs ou à des primers à double polymérisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Profondeur de polymérisation illimitée
- Retrait dérgé : un agent de remplissement très microfines
- Particules de remplissage sphériques en zircone offrant une résistance accrue à l'usure, une grande aptitude au polissage et un effet caméléon exceptionnel
- Grande solidité et haute esthétique dérmontrées à nécessité d'une couche de cuffage
- Teintes A1/B1, A2/B2, A3/B3, A3.5/B4, C2, C3, Blanchisseur et Color Wide Line (selon l'indicateur de guide des teintes VITA) pour une esthétique parfaite et les restaurations de toutes les teintes

INDICATIONS

Bulk EZ PLUS® est un matériau de restauration dentaire à base de résine, à double polymérisation (autopolymérisation avec accélération par photopolymérisation) qui, appliqué sur des surfaces dentaires préalablement traitées avec des primeurs ou des adhésifs appropriés, est indiqué dans les cas suivants :

- Restauration directe, classe I à VI
- Fond de cavité
- Reconstitution de faux-moignons
- Scellement des pivots
- Couronnes
- Toute application où la transmission de la lumière peut s'avérer inadéquate

ACCESSOIRES À USAGE UNIQUE

Les embouts malaxeurs sont à usage unique et fournis non stériles. Les embouts malaxeurs ne doivent pas être modifiés. Les accessoires à usage unique peuvent ne pas fonctionner comme prévu s'ils sont si miniaturisés. Cela peut entraîner une procédure inadéquate et un mauvais fonctionnement ou la défaillance du dispositif. Mettre au rebut après utilisation conformément aux instructions ci-dessous.

DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

Les seringues sont des dispositifs à usage multiple et sont fournies non stériles. Utiliser toujours un écran ou d'autres moyens pour éviter l'exposition ou le transfert de sang, de tissus ou de salive pouvant contenir des maladies infectieuses. À utiliser conformément aux instructions ci-dessous.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Conserver à l'abri de la lumière ou sous ou de la lumière ambiante ; remettre le capuchon après chaque utilisation.
- Utiliser une lampe halogène à photopolymériser avec une puissance minimale de 600 mW/cm2. D'autres sources ou intensités lumineuses nécessitent d'ajuster le temps de polymérisation. Se reporter aux instructions du fabricant de la lampe à photopolymériser.
- Le matériau à base de résine non polymérisé peut provoquer une irritation, notamment chez les personnes allergiques aux méthacrylates. Se laver les mains après toute manipulation de matériau.
- Le composite est formulé pour être utilisé à température ambiante. La durée de conservation à température ambiante est indiquée sur la seringue.
- Ne pas ranger le matériau composite à proximité de produits contenant de l'eugénol.

FRANÇAIS

- Ne pas laisser le composite entrer en contact avec des matériaux contenant de l'eugénol. L'eugénol est susceptible d'altérer le durcissement du composite et de provoquer une décoloration.
- Ne pas exposer les matériaux à des températures élevées ou à une lumière intense.
- Éviter toute contamination croisée en utilisant un nouvel embout malaxeur pour chaque patient et une gaine de protection.

APPLICATION DES SOINS DE RESTAURATION

PRÉPARATION DE LA DENT :

1. Isolez la dent pour éviter toute contamination par du sang et/ou de la salive. Les utilisations suggérées comprennent notamment une protection en caoutchouc, le système Isolite® ou la protection dentaire à photopolymériser Dam Cure® de Zest.
2. Terminez la préparation conventionnelle de la cavité avec des moyens classiques ou un système d'hydro-abrasion tel que le PrepStart® H2O de Zest.
3. Il est conseillé d'utiliser le Caries Finder™ de Zest afin d'obtenir une visualisation précise de l'élimination de la carie infectée ramollie avant la restauration.
4. Placez une matrice sectionnelle telle que le système fine contact matrice Mega-V® de Zest ou une forme de cale pour obtenir un contact et un contour idéaux.
5. Appliquez un agent de mordançage tel que Sure Etch™ de Zest ou une solution similaire conformément aux instructions du fabricant.
6. Appliquez un adhésif tel que Prelude® ou Prelude One® de Zest conformément aux instructions du fabricant.

PROCÉDURE DE RESTAURATION :

1. Retirez la protection en caoutchouc.
2. Appliquez un adhésif tel que Prelude® ou Prelude One® de Zest conformément aux instructions du fabricant.
3. Placez une matrice sectionnelle telle que le système fine contact matrice Mega-V® de Zest ou une forme de cale pour obtenir un contact et un contour idéaux.
4. Appliquez un agent de mordançage tel que Sure Etch™ de Zest ou une solution similaire conformément aux instructions du fabricant.
5. Appliquez un adhésif tel que Prelude® ou Prelude One® de Zest conformément aux instructions du fabricant.
6. Appliquez Bulk EZ PLUS® en couches profondes dans des zones proches de la pulpe, utilisez de l'bloqueur de calcium ou d'autres produits de protection de la pulpe.
7. Appliquez un cuffage de 20 secondes à chaque couche. Superposez les cuspides pour une polymérisation optimale.
8. Terminez la restauration à l'aide du système de finition et de polissage Enhance® de Zest.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce produit contient des monomères à base de méthacrylate susceptibles de provoquer une irritation cutanée, oculaire ou respiratoire et une sensibilisation chez les personnes sensibles. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Portez des gants. Lavez-vous les mains après avoir manipulé le produit.
- Polymérisez avec une lampe à photopolymériser à lumière bleue d'une puissance minimale de 1000 mW/cm2. Ajustez le temps de polymérisation pour d'autres lampes ou intensités. Consultez les instructions du fabricant de la lampe à photopolymériser.
- Évitez une exposition prolongée à la lumière ambiante.
- Refermez bien le tube après chaque utilisation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur des patients présentant une allergie connue à l'un des composants de la formulation.
- En cas de réaction allergique, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.
- Pour éviter toute contamination croisée, utilisez une nouvelle matrice sectionnelle pour chaque patient.

STOCKAGE

Conservez à une température entre 2 °C et 25 °C (36 °F et 77 °F). Évitez une exposition prolongée à la lumière ambiante.

ÉLIMINATION

Éliminez les dispositifs usagés présentant un risque d'infection conformément aux procédures en vigueur dans votre établissement de soins concernant les déchets cliniques, ainsi qu'aux réglementations locales et nationales. Recyclez les emballages si possible (consultez l'autorité compétente locale ou nationale pour connaître les réglementations locales et nationales (reportez-vous à la fiche de données de sécurité, le cas échéant).

AVIS À L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPÉENNE

Tout incident grave survenu en relation avec les dispositifs auxquels s'appliquent ces instructions d'utilisation doit être signalé au fabricant identifié dans la rubrique ci-dessus et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

GERMAN

Bulk EZ PLUS®
Dualhärtendes Bulk-Füllkomposit mit IntelliTek® Technologie

GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bulk EZ PLUS® ist ein einfach zu platzierendes, dualhärtendes Bulk-Füllkomposit, das bis fünfschichtige Applikation eine unbegrenzte Aushärtetiefe bietet. Bulk EZ PLUS® verwendet fortlaufend mit sphärischen Füllstoffen mit 20 nm Durchmesser mit enger Verteilung, die eine überlegene Biegefestigkeit, Verschleißfestigkeit, Polierbarkeit und Chamäleon-Effekt.

Bulk EZ PLUS® ist eine dualhärtende Füllungskomposit-Technologie, die eine Aushärtung durch Lichtpolymerisation und chemische Aushärtung kombiniert. Bulk EZ PLUS® verwendet fortlaufend mit sphärischen Füllstoffen mit 20 nm Durchmesser mit enger Verteilung, die eine überlegene Biegefestigkeit, Verschleißfestigkeit, Polierbarkeit und Chamäleon-Effekt

RESTORASYONU TAMAMLAMA:

1. Kapağı yerine yerleştirin.
2. Her kullanımdan önce tıkın tam olarak bir kalıcılık dişeni olana kadar makinenizi sıkarak bırakın.
3. Kapatmış kurumdaki metal kenarlı manuel olarak bükmek istemiyen açıp getirin.
4. Bir kartpostun ya zımparanın bir kenarını kullanarak, kapağın kenarlarını yumuşak açın ve miktarda malzemeyi sıkarak bırakın. Çıkarılır kontaminasyonu önlemek için her kaza için yeni bir kartpostu ya da kullanın.
5. Çapraz kontaminasyonu önlemek için zımpara kapatmak üzere bir banyan malzeme kullanın.

Not: Kısmitipinya izlenimi kullanıldığında kullanıldığında çıkarılır. Kullanıldığında çıkarılır. Kullanıldığında çıkarılır.